



Klosterhalbinsel

Biotoptypengruppen

- Basen- und Kalk-Zwischenmoore (> 10% Gehölzdeckung)
- Seggenriede der nährstoffreichen Moore und Sümpfe
- nährstoffreiche Moore und Sümpfe (> 10% Gehölzdeckung)
- Großseggenwiesen
- Feuchtwiesen nährstoffarmer Standorte
- Feuchtwiesen nährstoffreicher Standorte
- Frischwiesen, -weiden und Scherrasen
- Kanäle und Gräben
- Basen- und Kalk-Zwischenmoore (gehölzfrei)
- FFH-Gebiet Uckerseewiesen und Trockenhänge_DE 2749-301
- GSG-Grenze BR Schorfheide-Chorin (SC)

Managementplanung Natura 2000 im Land Brandenburg



Landesamt für
Umwelt,
Gesundheit und
Verbraucherschutz

Gefördert durch den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und durch das Land Brandenburg

FFH-Gebiet Uckerseewiesen und Trockenhänge_DE 2749-301 (Ausschnitt)

Karte 2: Biotoptypen

0 100 200 300 400 Meter

Maßstab 1:5 000

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:10.000 Normalausgabe
Koordinatensystem ETRS 89, Bezugsellipsoid GRS80
© GeoBasis-DE/LGB, 2012

Auftraggeber:
Landesamt für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz Brandenburg
Seeburger Chaussee 2
14476 Potsdam, OT Groß Glienicke

Bearbeitung: entera-user
Stand: 16.06.2015
Kartographie: LUGV / ÖZ

Auftragnehmer: